

ANTROUA


Variété : du Surinam, genre d'aubergine ronde vert/blanche très amère

Date de la première récolte : 2 mois environ


Durée de production : 2 à 6 mois

Calendrier de semis : tous les 3 mois


Cycle : 16 à 32 semaines




Travail du sol



Bêcher



Planches de
1 m de large




2 tonnes/ha

1 tonne/ha


Fumure de fond

Semis

En ligne à une profondeur de 0,5 à 1 cm



Arrosage en production :
Tous les 3 ou 4 jours




Maladies observées :
Attaques d'insectes




Traitement :
En cas d'attaques

Repiquage

3 à 4 feuilles, 60 cm entre chaque plant sur 2 rangs par planche (plantation en quinconce). Arrosage journalier pendant une semaine.



Fumure d'entretien :
Standard



Prix de vente moyen :
10 F les 5 (suivant grosseur)

Conseils de culture : Pour la récolte des graines, prendre un fruit mûr mais non pourri ou sec (couleur marron/orangé) et semer la graine sans la faire sécher.


ARACHIDE

Variété : Locale


Première récolte : Cycle de 3 mois (saison sèche)

Durée de production : En une seule fois


Calendrier de semis : Tous les 3 mois




Travail du sol



Bêcher



En plein
(mécanisable)




2 tonnes/ha

1 tonne/ha

Fumure de fond
(il est possible de forcer sur la chaux pour éviter les cosses vides)

Semis direct

Une graine en ligne tous les 10 cm
30 cm entre les lignes
Profondeur de plantation 3 cm



arrosage

Arroser sur une profondeur de 15 cm pour favoriser une levée régulière



Buttage :

1 semaine après floraison
(enterrer le plant à 1/2)




Arrosage en production :

2 ou 3 arrosages si nécessaire




Traitement :

Néant




Fumure d'entretien :

Néant



Maladie observée :

Néant



Récolte :

A 3 mois arrachage, séchage
(un séchage rapide est important
avec une ventilation et un chauffage
si possible)

Conseils de culture : Les fourmis rouges mangent les graines, un épandage d'insecticide peut parfois être nécessaire (Basudine). L'arrachage avec une bêche à dents est conseillé pour éviter de laisser les graines en terre.


AUBERGINE

Variété : Nerval, Balaroi et locale


Durée de production : Variété locale 2 à 6 mois

Calendrier de semis : tous les 3 mois


Cycle : 16 à 32 semaines




Travail du sol



Bécher



Former des billons
ou buttes de 60 cm



2 tonnes/ha

1 tonne/ha

Fumure de fond

Semis


En ligne, profondeur de plantation 0,5 à 1 cm



Repiquage


A 3/4 feuilles tous les 60 cm

Arrosage journalier pendant 1 semaine



Arrosage en production :

Tous les 3 ou 4 jours



Fumure d'entretien :


12.12.24 : 150 Kg/ha

Tous les mois pendant 6 mois



Maladies observées :

- Flétrissement bactérien (10% des pieds)
- Attaques d'insectes



Prix de vente moyen :

10 F les 5 ou 6




Traitement :

En cas d'attaques d'insectes (conseils auprès du vendeur ou Protection des végétaux).
Contre le flétrissement, élever le PH du sol avec de la chaux et de boues résiduelles.

Conseils de culture : Les variétés vendues dans le commerce ne sont pas résistantes au flétrissement bactérien (après 3 mois => 30 % de mortalité). Il est souhaitable de prendre une variété locale résistante (la variété Nerval l'est).
A l'apparition de fourmis, un traitement avec Basudine est nécessaire.

CHOU CABUS



Variété : Africa cross (vert bleuté)


Première récolte : 2 mois minimum

Durée de production : 3 semaines


Calendrier de semis : toutes les 3 semaines

Cycle : 4 mois


Travail du sol



Bécher



1 m de large




2 tonnes/ha

1 tonne/ha

Fumure de fond


Semis

En ligne, démarrage long
à 0,5 cm de profondeur



Repiquage

35/40 jours, distance 25/30 cm. Une ombrière permet
un meilleur démarrage et une récolte plus précoce
(à une hauteur de 70 cm pour ombrage léger).




Arrosage en production :

Tous les 3/4 jours




Fumure d'entretien :

3 semaines après repiquage
300 gr pour 20 m² entre les pieds



Maladies observées :

L'insecte pyrale mange les feuilles
(trous)



Prix de vente moyen :

10 F la tête




Traitement :

Bacillus thuringiensis (Bactospéine ou collapse) en prévention si c'est une zone endémique.
Autrement, attendre les premiers symptômes.
Le traitement doit être fait avant la pommaton.

Conseils de culture : Une ombrière pour le repiquage n'est pas absolument nécessaire.
Un semis clair est préférable pour éviter d'avoir des plants trop fins. En zone argileuse, prévoir des canaux.

CHOU CHINOIS



Variété : Pet saï - Am Soy

Durée de production : 15 jours


Calendrier de semis : Tous les 15 jours

Cycle : 5 à 6 semaines


Travail du sol



Bêcher



En planches d'une
largeur de 1 m





2 tonnes/ha

1 tonne/ha


Fumure de fond

Semis


Direct à la volée en surface (pas de recouvrement), éclaircir après une semaine.
La levée est rapide en deux jours, laisser un pied tous les 5 cm en tous sens.



Arrosage en production :
Tous les 3 ou 4 jours




Récolte :
Pied entier



Maladies observées :

- Rhizoctone
- Pyrale : attaques possibles




Pied entier :
10 F les 2 à 3 pieds



Traitement :
Bacillus thuringiensis
(Bactospéine ou collapse).

Conseils de culture : Les graines étant en surface, les fourmis peuvent les voler. Un traitement avec de la Basudine est conseillé.

CHOU DE CHINE




Variété : Victory

Première récolte : 60 jours

Durée de production : 3 semaines

Calendrier de semis : 1 mois


Travail du sol



Bécher



Former des
planches




2 tonnes/ha

1 tonne/ha

Fumure de fond


Semis

En pépinière, 1 à 2 g/m² en ligne distante de 10 cm
Possibilité de réaliser des semis en plein.



Repiquage

Conseillé




Arrosage en production :

1 par jour hors soleil,
pendant 1 semaine,
puis en fonction des besoins




Fumure d'entretien :

Pas nécessaire



Maladies observées :

Il y a des vers dans la tige.
Probablement des chenilles de
Phitella xylostella (la teigne des cru-
cifères).



Prix de vente :

10 F les 3




Traitement :

En cas d'attaque :
Bactospéine ou collapse :
6 à 10 g /10 L, une fois par
semaine si nécessaire

Conseils de culture : En plein sur sol préparé, semis mélangés avec du sable fin pour diminuer la densité de plants. Un léger ombrage est conseillé, il monte en fleur trop rapidement.

CONCOMBRE




Variété : Poinset

Durée de production : 1 mois


Calendrier de semis : tous les mois

Cycle : 10 semaines


Travail du sol



Bécher



Former des billons
ou buttes




2 tonnes/ha

1 tonne/ha

Fumure de fond (ou 6 Kg de 12.4.25 / 100 M²)


Semis

3 à 4 graines en poquets



Repiquage

Tous les 2 jours pendant 2 semaines



Arrosage en production :
Tous les 3 ou 4 jours



Fumure d'entretien :
Pour 100 m² : 6 Kg de 12.4.25
15 jours après la plantation
30 jours après la plantation



Maladies observées :
Antrachnose
Insecte pyrale : Traiter avec
Bactospéine 6 à 10 g / 10 L en cas
d'attaque.



Récolte :
Tous les 2 jours




Traitement :
Début d'attaque antrachnose :
• Peltar : 60 g /10L
• Pelt 44 : 50 ml /10L
• Dithane M45 : 25 g /10L
Délai de récolte : 7 jours



Prix de vente moyen :
10 F les 4

Conseils de culture : Le lever des semis est assez délicat, il faut tenir la terre humide et éviter un semis trop profond, l'idéal est de 1 cm.

COURGETTE




Variété : Diamant / non coureuse

Date de la première récolte : 45 à 50 jours après semis


Durée de production : Toutes les 2 semaines

Cycle : 10 semaines


Travail du sol



Bêcher



Former des billons
ou buttes




2 tonnes/ha

1 tonne/ha

Fumure de fond

Semis


Direct, 2 graines tous les 60 cm, en saison sèche uniquement ou sous serre. Profondeur de plantation.



Arrosage

Maintenir la terre humide pendant 1 semaine

Arrosage en production : pas d'excès



Maladies observées :

- Pourriture sur fruit.
- Il faut couper les fleurs dès que le fruit est formé et traiter tout de suite avec un fongicide
- Insecte pyrale




Fumure d'entretien :

Urée 500 g / 20 ml
1 fois par mois



Traitement :

Pyrale : traiter dès les premières attaques avec Bactospeïne : 6 à 10 g / 10 L, une fois par semaine si nécessaire. Traitement permis à la floraison.




Récolte :

Tous les jours pendant 30 à 40 jours

Conseils de culture :


- Très sensible à la pourriture noire du jeune fruit, il est souhaitable de cultiver en saison sèche ou sous serre. Il n'y a pas de produit de traitement.
- Très sensible à la mosaïque, il n'y a pas de produit de traitement.
- Possibilité de cultiver sur une même parcelle tous les deux ou trois ans car le champignon résiste plusieurs années dans le sol. L'espace entre les lieux de plantation doit être de 50 mètres. Il faut préférer les variétés non coureuses.



Prix de vente moyen :

10 F les 3 ou 4

HARICOT KILOMETRE




Durée de production : 4 semaines


Calendrier de semis : tous les mois

Cycle : 12 semaines


Travail du sol



Bêcher



Former des billons
Butter lors
des désherbages



2 tonnes/ha

1 tonne/ha



Fumure de fond

Semis


Poquet de 3 à 4 graines, tous les 30/40 cm
Profondeur de plantation : 2 cm

Arrosage

Tous les 2 jours si nécessaire
Arrosage en production : Normal




Maladies observées :
Attaques d'insectes



Fumure d'entretien :
Standard : 0,5 Kg/20 m²
Tous les 15 jours en surface




Tuteurage :
Tous les 30 cm par rame



Récolte :
Tous les 2 jours




Traitement :
Pucerons : en cas d'attaque
• Pinimor : 7,5 gr / 10 L
• Croneton : 10 ml / 10 L



Prix de vente moyen :
10 F la botte

Conseils de culture : Les haricots sont attaqués par des petites abeilles contre lesquelles les produits de traitement sont interdits pendant la floraison.

HARICOT MANGE TOUT



Variété : Nain (Contender)

Durée de production : 3 semaines


Calendrier de semis : 3 semaines

Cycle : 2 mois


Travail du sol



Bêcher



Former de petits billons tous les 50 cm à chaque désherbage



2 tonnes/ha

1 tonne/ha


Fumure de fond

Arrosage

Tous les 2 jours

Semis

En poquet de 3 ou 4 graines tous les 15 cm à 2 cm de profondeur. Eventuellement trempage 1 nuit avant semis.




Arrosage en production :

Moyen, régulier
matin/soir




Fumure d'entretien :

Standard



Maladies observées :

- Attaques d'insectes :
- Tigre : sans traitement, 50 % du feuillage détruit en 1 mois.
 - Pucerons
 - Chrysomelles




Récoltes :

Tous les 2 jours



Traitement :

En fonction des attaques




Prix de vente moyen :

10 F les 500 gr

Conseils de culture : Germination et jeunes pieds assez délicats (pourriture).
Il est souhaitable de préférer les variétés grimpantes.

MAIS DOUX




Variété : Locale

Date de la première récolte : Cycle de 4 mois


Durée de production : 2 semaines

Calendrier de semis : Toute l'année


Travail du sol



Bêcher



En plein
(billons si petite
quantité)




2 tonnes/ha

1 tonne/ha

Fumure de fond

Semis

Direct, 1 grain tous les 15 cm, 30 cm entre les rangs



Arrosage

1 fois abondamment



Arrosage en production :


Tous les 15 jours



Fumure d'entretien :


0,5 Kg tous les 20 M²

1 fois par mois pendant 2 mois



Maladies observées :

Insecte Pyrale




Récolte :

150 épis sur 20 M²



Traitement :

Pyrale : en cas d'attaque
Bactospéine : 6 à 10 g / 10 L
Une fois par semaine si nécessaire




Prix de vente moyen :

5 F l'épi ou 10 F les trois

Conseils de culture : Un travail du sol en profondeur est conseillé pour favoriser un bon enracinement (risque de chute de pied).

MELON D'EAU



Variété : Sugar baby


Première récolte : 75 jours

Durée de production : 15 jours

Calendrier de semis : tous les 15 jours en saison sèche

Cycle : 3 mois


Travail du sol



Bêcher



Former des buttes
tous les mètres




2 tonnes/ha

1 tonne/ha

Fumure de fond

Semis

Direct, 3/4 graines par butte, à 3 cm de profondeur



Arrosage

Maintenir humide une semaine




Arrosage en production :

Tous les 5 jours en fonction des besoins
N'aime pas l'eau à la floraison




Fumure :

12.12.24 : 0,5 Kg/20 M²
Tous les 15 jours en surface



Maladies observées :

Anthraxose
Pyrale




Récolte :

Stocker 3/4 jours à l'ombre avant
des les vendre. (meilleur)



Traitement :

- Anthraxose :
Poltar 60 g / 10 L
Pelt 44 50ml / 10 L
Dithane M45 25 g / 10 L
- Pyrale :
Bactospéine 6 à 10 g / 10 L




Prix de vente moyen :

20 à 30 F le fruit

Conseils de culture : Eviter de cultiver les melons d'eau en saison des pluies.
N'aime pas l'eau à la floraison.

POIVRON



Variété : Capela

Première récolte : 8 semaines après repiquage

Durée de production : 2 à 3 mois

Calendrier de semis : semis tous les 2 mois,


durée en pépinière : 30 à 35 jours

Cycle : 4 à 5 mois


Travail du sol



Bêcher



Former des billons
ou planches




2 tonnes/ha

1 tonne/ha

Fumure de fond

Semis


En ligne, profondeur 1,5 cm en pépinière,
idéalement en godet.



Repiquage


De 30 à 35 jours (4/5 feuilles).

Il est délicat de prendre de bonnes mottes et des
les espacer tous les 40 cm.



Arrosage en production :

Normal (en culture : 1 tous les 3
jours)



Fumure d'entretien :

12.12.24 : 0,5 Kg / 20 m² tous les
15 jours en surface


Si longue durée :

passer à 1 à 2 Kg / 20 m² tous les
3 mois avec binage.



Maladies observées :

Rien à ce jour




Récolte :

2 fois par semaine



Traitement :

Ponctuellement, en cas d'attaque
d'insectes




Prix de vente moyen :

10 F les 500 gr

Conseils de culture : Repiquage délicat, préférer un semis en godet et repiquer les plants assez petits, environ 10 cm.
Tuteurage pas nécessaire.

POTIMARON




Variété : Locale

Durée de production : 4 semaines

Calendrier de semis : toutes les 4 semaines


Travail du sol



Bêcher



Former des buttes




2 tonnes/ha

1 tonne/ha

Fumure de fond

Semis

Direct 3/4 graines par buttes, profondeur de plantation 3 cm, maintenir humide une semaine.




Arrosage en production :

En fonction des besoins
N'aime pas l'eau à la floraison



Fumure d'entretien :

Standard



Maladies observées :

- Anthracnose
- Thrips : traiter avec Vertimec
5 ml / 10 L (permis à la floraison)
Délais de récolte 4 jours



Prix de vente moyen :

10 F le fruit



Traitement :

Début d'attaque anthracnose

- Peltar : 60 g / 10 L
- Pelt 44 : 50 ml / 10 L
- Dithane m 45 : 25 g / 10 L

Délai de récolte : 7 jours

Conseils de culture : Problèmes de thrips, les traitements existants sont inefficaces. Il faut préférer les variétés locales.

RADIS


Variété : Locale ou "18 jours"

Première récolte : 20 jours


Durée de production : 8 jours

Calendrier de semis : toutes les semaines



Cycle : 2 à 3 semaines



Travail du sol



Bêcher




2 tonnes/ha

1 tonne/ha

Fumure de fond

Semis

Direct, graine par graine tous les 3 cm, à une profondeur de 3 cm.




Arrosage en production :

2 fois par jour
(pour rester doux)




Traitement :

Insecticide selon l'importance des
attaques



Récolte :

A vue, selon le diamètre




Prix de vente moyen :

10 F la botte

Conseils de culture : Semis sous ombrière déconseillés. Pour des semis en jardinière, mettre celle-ci à l'horizontale afin que l'eau d'arrosage soit correctement répartie. Un semis en pleine terre est préférable, il donne de meilleurs résultats. Choisir une terre légère. Préférer les variétés locales.

SALADE



Variété : Laitue Batavia, Minetot


Première récolte : 5 à 6 semaines après semis de 25 jours

Durée de production : 15 jours


Calendrier de semis : tous les 5 ou 15 jours

Cycle : 8 à 9 semaines


Travail du sol



Bêcher



En jardinière
ou en planche




2 tonnes/ha

1 tonne/ha

Fumure de fond

Semis


En ligne, les graines seront mélangées avec du sable fin (semis plus clairsemés).



Repiquage


Après 20 jours (5 à 6 feuilles) à 20 cm de distance

- Batavia, ombrage très léger sur le semis
- Minetot, beaucoup d'ombre




Arrosage :

1 fois par jour, léger.



Maladies observées :

- Cercospora : nécrose sur les feuilles
- Attaques possibles : Mineuse



Récolte :

à vue, selon le diamètre




Traitement :

Début d'attaque Cercospora :

- Peltar : 60 g / 10 L
- Pelt 44 : 50 ml/10 L
- Dithane M 45 : 25 g / 10 L

Délai de récolte : 7 jours




Prix de vente moyen :

10 F la tête

Conseils de culture : Les salades montent à la chaleur. Pour le repiquage, une bonne ombrière, légère est conseillée pour briser l'eau de pluie et éviter les projections de terre sur les feuilles. Espèce conseillée : Minetot.

SOROSSIS



Variété : Forme concombre, pointu


Première récolte : 2 à 3 mois

Durée de production : 2 à 3 mois


Calendrier de semis : 2 mois

Cycle : 4 à 5 mois


Travail du sol



Bêcher



Former des billons
ou buttes




2 tonnes/ha

1 tonne/ha

Fumure de fond

Semis


Direct, 1 graine tous les 40 cm (levée longue), à 2 ou 3 cm de profondeur.




Arrosage en production :
1 fois par semaine si nécessaire



Traitement :
En fonction des attaques




Fumure d'entretien :
12.12.24 : 0,5 Kg/20 m²
Tous les 15 jours en surface



Récolte :
Lorsqu'ils virent au blanc (vert-blanc), tous les 4 jours. Eviter d'avoir une récolte de fruits oranges ou rouges, car à ce stade, les graines rouges sont toxiques.



Tuteurage :
Sur tonnelle (fruits pendants)
1,20 m à 1,60 m



Prix de vente moyen :
10 F les 4 ou 5

Conseils de culture : C'est une plante grimpante qui peut se cultiver à terre. Mais une culture en tonnelle de 1,60 m de haut est préférable afin d'avoir des fruits droits, plus longs et une récolte facile.